問題1

(1) 与式を因数分解すると、

$$p = (n - 19)(n - 17)$$

となり、2つの積に分解できます。 p は素数なので、どちらかは ± 1 で、

$$n - 19 = \pm 1, n - 17 = \pm 1 \Rightarrow n = 16, 18, 20$$

が解の候補となります。ここで、 $p > 0$ なので、 $n = 18$ は不適です。よって、

$$(p, n) = (3, 16)(3, 20)$$

です。

(2) こちらも与式を因数分解すると、

$$p = (n + 2)(n^2 - 2n + 4) = (n + 2)\{(n - 1)^2 + 3\}$$

となりなりますが、 $\{(n - 1)^2 + 3\} > 1$ なので、

$$n + 2 = 1 \Rightarrow n = -1$$

となります。よって、

$$(p, n) = (7, -1)$$

です。

(3) 与式が3の倍数であることを示します。次のように変形すると、

$$\begin{aligned} n^3 - 19n - 27 &= n^3 - n - 18n - 27 = n(n^2 - 1) - 9(2n + 3) \\ &= (n - 1)n(n + 1) - 9(2n + 3) \end{aligned}$$

となって、第1項目は連続する3個の整数の積なので、3の倍数です。また、第2項目は9の倍数なので、3の倍数です。そして、3の倍数の中で素数 p は3だけなので、

$$n^3 - 19n - 27 = 3 \Rightarrow n = -3, -2, 5$$

です。よって、

$$(p, n) = (3, -3), (3, -2), (3, 5)$$

です。

問題2

(1) 与式を変形して解けそうにないので、素数 q を3の剰余類で類別して考えました。

・ q が3で割った余りが1または2の場合

与式を次のように変形します。

$$p = q^2 + 2 = (q - 1)(q + 1) + 3$$

すると、 $q - 1$ または $q + 1$ が3の倍数なので、 p は3より大きな3の倍数となります。そのような素数は存在しないので、このケースあり得ません。

・ q が3で割った余りが0の場合

このケースに当てはまる素数 q は3だけなので、 $p = 3^2 + 2 = 11$ です。

以上より、

$$(p, q) = (11, 3)$$

です。

(2) 与式を変形すると、

$$p^2 = 12q - 1 \Rightarrow (p - 1)(p + 1) = 2^2 \cdot 3q$$

となりますが、 p は素数なので、 $p \pm 1$ は偶数です。2を因数に持つので、

$$A \begin{cases} p - 1 = 2 \cdot 3 \\ p + 1 = 2 \cdot q \end{cases} \quad \text{または} \quad B \begin{cases} p - 1 = 2 \cdot q \\ p + 1 = 2 \cdot 3 \end{cases}$$

です。Aの解は $(p, q) = (7, 4)$ ですが、 q が素数ではないので、不適です。Bの解は $(p, q) = (5, 2)$ で、条件を満たします。

よって、

$$(p, q) = (5, 2)$$

です。

問題3 $\triangle ABC$ に余弦定理を適用すると、

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

ですが、与式は上式で $C = \frac{\pi}{3}$ とやった場合で、

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \frac{\pi}{3} = a^2 + b^2 - ab$$

です。ここで、 $a = b$ なら、

$$c^2 = a^2 + b^2 - ab = a^2 + a^2 - a^2 = a^2 \Rightarrow c = a$$

ですから、正三角形です。 $a \neq b$ のケースはあり得ないので(証明は補足に記載)、 $\triangle ABC$ は辺の長さが素数の正三角形となります。

追加問題1

図のように、各点に記号を付けます。ただし、M,NはそれぞれCD,EFの midpoint とします。正方形と正三角形の一辺の長さをaとし、 $\angle OCM$ に三平方の定理を適用すると、

$$OM^2 + CM^2 = OC^2 \Rightarrow (MN + ON)^2 + CM^2 = OC^2$$

$$\Rightarrow \left(CF + \frac{\sqrt{3}}{2} OF \right)^2 + \left(\frac{CD}{2} \right)^2 = 1^2$$

$$\Rightarrow \left(a + \frac{\sqrt{3}}{2} a \right)^2 + \left(\frac{1}{2} a \right)^2 = 1^2 \Rightarrow a = \pm \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2}$$

です。ここで、 $a > 0$ なので、一辺の長さは $\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2}$ です。

追加問題2

図のように、各点に記号を付けます。正方形と正三角形の一辺の長さをaとすると、

$$ON + NM + MP = 1 \Rightarrow FN + CF + \frac{\sqrt{3}}{2} CP = 1$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} EF + CF + \frac{\sqrt{3}}{2} CP = 1$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} a + a + \frac{\sqrt{3}}{2} a = 1 \Rightarrow a = \frac{3 - \sqrt{3}}{3}$$

です。よって、一辺の長さは $\frac{3 - \sqrt{3}}{3}$ です。

補足 $a \neq b$ のとき、 $a^2 - ab + b^2 = c^2$ を満たす整数解は存在しない

$a^2 - ab + b^2 = c^2$ はディオファントス方程式の1つですが、 a, b, c が互いに素であるもの(原始解)は、互いに素な整数 m, n ($n < m$) を用いて、次のように表せることが知られています。

$$a = m^2 - n^2 \dots \textcircled{1}$$

$$b = 2mn - n^2 \dots \textcircled{2}$$

$$c = m^2 - mn + n^2 \dots \textcircled{3}$$

これを用いて、 $a \neq b$ を仮定して矛盾を導きます。

①より、

$$a = (m - n)(m + n)$$

と分解できますが、 a は素数なので、どれかは1でなければなりません。 $m, n > 0$ なので、

$$m - n = 1 \Rightarrow m = n + 1$$

です。これを②に入れると、

$$b = 2mn - n^2 = 2(n + 1)n - n^2 = n(n + 2)$$

ですが、 b は素数なので、 $n = 1$ です。このとき、 $m = n + 1 = 1 + 1 = 2$ です。これを①②に入れると、

$$a = m^2 - n^2 = 2^2 - 1^2 = 3$$

$$b = 2mn - n^2 = 2 \cdot 2 \cdot 1 - 1^2 = 3$$

となります。これは、仮定 $a \neq b$ に反します。

よって、 $a^2 - ab + b^2 = c^2$ を満たすのは、 $a = b = 3$ のときに限ります。原始解でない解(共通の約数を持つ解)を考えても、 a, b が素数となるのは原始解の場合に限られます。

したがって、 a, b が異なる素数であり、かつ c が整数となるような解 (a, b, c) は存在しません。